

Las alas posteriores son más claras, sobre todo hacia la base; fuera de la línea ondulada que se continúa ligeramente por ellas, no presentan dibujo alguno. Los flecos son más claros en la base que el color del fondo, y su mitad exterior, menudamente dividida, es de color gris blanquecino.

La coloración de la cara inferior de las alas es más clara; su área media está limitada en todas ellas por una línea curva, y los puntos medios están indicados solamente en las posteriores. En cambio existen en las anteriores tres puntos sobre el borde anterior, que corresponden á los de la cara superior de las mismas, faltando el más interno.

Las patas son de un pardo claro, anilladas de blanco y con espolones de forma normal.

El abdomen es del mismo color gris de las alas posteriores, y lleva por encima del segundo segmento un mechoncito más obscuro.

Long. del cuerpo, 29; del ala anterior, 14 mm.

Parece debe ser colocada entre *Eriopoda* H. S. y *Micans* Ltr.

Descubierta en los alrededores de Murcia por el Sr. Wicht, á quien está dedicada.

Nueva especie de «*Gryllomorpha*» de Marruecos.

POR

D. IGNACIO BOLÍVAR.

Desde que el P. Pantel publicó en los ANALES de esta SOCIEDAD su Monografía de las especies de este género, estudio notable por la claridad con que están apreciadas y expuestas las diferencias que presentan y que permiten admitir varios grupos que deben ser considerados como otros tantos géneros, estudio presentado modestamente con el nombre de *Révision monographique du genre «Gryllomorpha»*, Fieb., 1890, nada nuevo se ha publicado sobre este género; solamente M. Finot, en sus *Orthoptères d'Algérie et de Tunisie*, ha ampliado el área geográfica de la *G. uclensis* Pant., citándola de Algérie (Finot); Orán (Brunner); Biskra; Tunisie (Sicard); TebourSouk, y precisando más las de la *dalmatina* Ocsk. y *longicauda* Rbr. en el Norte de África.

El descubrimiento de una especie de *Gryllomorpha* en Mogador modifica la consideración de género exclusivamente mediterráneo, que le atribuye el esclarecido naturalista á que me refiero, á menos de que se admita que la fauna de esta región pueda considerarse no solo como paleártica, en lo que ha de haber conformidad, sino como una mezcla de atlántica y mediterránea, á lo que me inclino en vista del carácter de los animales que ha recogido el Sr. Martínez de la Escalera y por la opinión de éste nuestro colega.

La especie que voy á describir pertenece al grupo de la *Gryllomorpha uclensis* Pant., es decir, que es una *Gryllomorpha s. str.*, y tiene el mismo tamaño y librea que la especie de Uclés, que por lo demás ha sido ya señalada de varios puntos de la Península y hasta de Argelia y Túnez, como se deja dicho, alcanzando un área geográfica mucho más extensa de lo que podía suponerse su ilustre descriptor.

Seguramente que los descubrimientos de nuestros viajeros han de poner en claro las relaciones de la fauna marroquí con la europea y los caracteres de las diferentes regiones que en ella deban distinguirse.

Gryllomorpha Maghzeni sp. nov.

Pusilla, opaca, lurido testacea, fusco-maculosa, pallide-tomentosa, nigro-setosa. Corpus parallelum, modice medio dilatatum et depressum. Caput pronoto vix latius nitidum. Ocelli in triangulum obtusangulum dispositi; ocelli laterales ab oculo et ab ocello medio subæque distant. Processus interantennalis articulo basali antennarum haud latior superne fusco-maculatus. Caput supra lineis longitudinalibus quatuor albidis postice fusco-striatum. Oculi fusci, linea infra oculos fusca. Articulus terminalis palporum maxillarium articulo penultimo distincte longior, truncatura fere ad medium ducta. Pronotum pallidum, marginibus antico posticoque nigrociliatis angustissime fuscis, margine postico pallide interrupto, disco fascia abbreviata transversa fusca; lobis deflexis, superne a disco linea fusca separatis, margine infero valde obliquo. Mesonotum parvum, disco fusco, medio pallide interruptum. Mesonotum amplius linea media pallida. Elytra nulla. Abdomen dorso fuscum. Tibiæ intermediæ 4-calcaratæ, calcare supero externo perfecte explicato. Tibiæ posticæ supra serrulatæ distincte canaliculatæ spina seriei externæ ultima calcare

subsequenti brevior, calcaribus duobus superioribus internis longissimis dimidium metatarsi superantibus. Tarsi postici articulus primus robustus prismaticus distincte compressus, marginibus superioribus arcuatis, superne angustissimus distinctissime serrulatus; unguiculis articuli tertii longissimis gracilibus. ♀ Lamina supraanalis elongato-triangularis, marginibus incrassatis reflexis prope basin distincte coarctatis. Ovipositor rectus, cercis distincte longior. Lamina subgenitalis parva transversa apice lata truncata.

<i>Long. corporis</i>	9	mm.
» <i>pronoti</i>	1,5	
» <i>fem. post.</i>	7,5	
» <i>tibiar. post.</i>	5,5	
» <i>tarsor</i>	3	
» <i>ovip</i>	8	

Loc. Mogador; Martínez de la Escalera.

La mayor longitud del oviscapto distingue á primera vista esta especie de la *G. uclensis* Pant., pero comparada con ella se observan bien pronto otras diferencias más importantes, como son: el mayor desarrollo y robustez de las patas posteriores y la longitud relativa de sus espolones, de los cuales los dos superiores internos son muy largos y delgados y pasan de la mitad del metatarso, siendo un poquito más largo el superior y ambos de doble longitud que el inferior. El metatarso es también más robusto, comprimido lateralmente y arqueado por encima, lo que es debido á que se estrecha hacia la base. Por último, las uñas del artejo terminal son notablemente largas y finas, lo cual contrasta con las del *G. uclensis* Pant. La coloración difiere poco de la de esta especie, si bien, en general, es de un tono más oscuro, pero esta diferencia bien puede ser individual y variable. Los fémures posteriores presentan fajas pardas transversas en la cara interna.